

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

يوتيروكس® 25 ميكروغرام
يوتيروكس® 50 ميكروغرام
يوتيروكس® 100 ميكروغرام

أقرص

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص على ليفوثيروكسين صوديوم (Levothyroxine sodium) 25، 50 أو 100 مكغ. المواد غير الفعالة والمسببة للحساسية في المستحضر: انظر البند 2 تحت عنوان "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء

يوتيروكس يعيارات دوائية مختلفة يستعمل لعلاج الحالات التالية:

- تضخم الغدة الدرقية الحميد (ورم درقي حميد - انتفاخ في العنق بسبب تضخم الغدة الدرقية) لدى معالجين ذوي نشاط سليم للغدة الدرقية
- منع تكرار ظهور ورم درقي بعد عملية جراحية
- بديل للهورمون الطبيعي الذي تنتجه الغدة الدرقية إذا كانت الغدة الدرقية لا تنتج ثيروكسين بكمية كافية
- تثبيط تجدد نمو ورم لدى معالجين يعانون من سرطان الغدة الدرقية
- لموازنة مستويات الهورمون الذي تنتجه الغدة الدرقية، وذلك عندما يعالج فرط نشاط الغدة الدرقية بأدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقية

بجرعة دوائية قدرها 100 مكغ وما فوق، يستعمل يوتيروكس لفحص سلامة نشاط الغدة الدرقية.

الفصيلة العلاجية: هورمون الغدة الدرقية (Thyroid).

ليفوثيروكسين، المركب الفعال في يوتيروكس، هو بديل اصطناعي للهورمون الطبيعي المنتج من قبل الغدة الدرقية ويستعمل لعلاج أمراض الغدة الدرقية أو في قصور الأداء الوظيفي للغدة الدرقية. ليفوثيروكسين ذو تأثير مشابه للهورمون الطبيعي المنتج من قبل الغدة الدرقية.

2. قبل استعمال الدواء

من أجل ضمان استمرار العلاج بالمستحضرات الحاوية لليفوثيروكسين صوديوم، فإن إستبدال مستحضر معين يحوي ليفوثيروكسين صوديوم بمستحضر آخر، يتم فقط باستشارة طبية شخصية وبمراقبة حثيثة للمعالج.

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أليرجي) للمادة الفعالة لليفوثيروكسين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6)
- كنت تعاني من خلل وظيفي غير معالج للغدة الكظرية أو الغدة النخامية أو فرط نشاط غير معالج للغدة الدرقية (انسداد درقي)
- كنت تعاني من مرض قلبي شديد (احتشاء عضلة القلب أو التهاب القلب)

لا يجوز استعمال الدواء سوية مع أدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقية، وذلك إذا كنت في فترة الحمل (انظري تحت "الحمل والإرضاع" لاحقًا)

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- قبل بدء العلاج بـ يوتيروكس، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من أحد أمراض القلب التالية:
- اضطراب في تدفق الدم في الأوعية الدموية التاجية (ذبحة صدرية، angina pectoris)
 - قصور القلب
 - نبض سريع وغير منتظم
 - ضغط دم مرتفع
 - طبقة شمعية على جدران الشرايين (تصلب الشرايين، arteriosclerosis)

في هذه الحالات يجب أن تكون متوازن من ناحية طبية وذلك قبل أن تبدأ بتناول يوتيروكس أو قبل إجراء فحص تثبيط نشاط الغدة الدرقية. في فترات متقاربة، يتوجب فحص مستويات الهورمون الذي تنتجه الغدة الدرقية أثناء العلاج بـ يوتيروكس. إذا لم تكن متأكدًا من وجود هذه الحالات لديك، أو لا تتلقى علاجًا لها، كن على اتصال بالطبيب.

يفحص الطبيب فيما إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الغدة الكظرية، الغدة النخامية أو الغدة الدرقية مع إنتاج زائد وغير مراقب لهورمونات الغدة الدرقية (استقلالية الغدة الدرقية)، لأن هذه الحالات يجب أن تكون متوازنة من ناحية طبية قبل أن تبدأ بتناول يوتيروكس أو قبل إجراء فحص تثبيط نشاط الغدة الدرقية.

يجب مراقبة ضغط الدم بشكل متواتر عند بدء العلاج بليفوثيروكسين لدى خدج الذين كان وزنهم عند الولادة منخفض جدًا لأنه قد يحدث هبوط سريع في ضغط الدم (فشل دوراني).

قد يحدث عدم توازن في هورمونات الغدة الدرقية إذا توجب عليك تبديل الدواء الخاص بك بمستحضر آخر يحتوي على ليفوثيروكسين. توجه إلى طبيب إذا توفرت لديك أسئلة بخصوص تبديل الدواء. يتطلب الأمر مراقبة متواترة (سريرية وبيولوجية) خلال فترة الانتقال. احك للطبيب إذا قاسيت من أعراض جانبية لأن ذلك قد يدل على الحاجة لملاءمة المقدار الدوائي (رفع أو خفض).

احك للطبيب:

- إذا كنت في فترة انقطاع الطمث (سن اليأس) أو بعدها (فترة ما بعد سن اليأس)؛ بسبب الخطورة للإصابة بمرض تخلخل العظام، من الجائز أن يحتاج الأمر فحص نشاط الغدة الدرقية بصورة منتظمة.
- قبل بداية، توقف أو إجراء تغيير في تناول أورليستات (دواء يستعمل لعلاج السمنة المفرطة). من الجائز أن تكون هناك حاجة إلى المراقبة عن كثب وملاءمة المقدار الدوائي.
- إذا كنت تقاسي من علامات لاضطرابات ذهانية، فمن الجائز أن يحتاج الأمر إلى المراقبة عن كثب وملاءمة المقدار الدوائي.

لا يجوز استعمال هورمونات الغدة الدرقية لخفض الوزن. إن استعمال هورمونات الغدة الدرقية لا يؤدي إلى انخفاض في وزنك، إذا كانت نسبة هورمون الغدة الدرقية ضمن الحدود الطبيعية. أعراض جانبية شديدة أو حتى مهددة للحياة قد تظهر في حال زيادتك للجرعة الدوائية دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول مقادير دوائية مرتفعة من هورمونات الغدة الدرقية سوية مع أدوية معينة لتخفيض الوزن مثل أمفيبرامون، كاتين وفينيل پروبانولامين، لأن خطورة حدوث أعراض جانبية شديدة أو حتى مهددة للحياة قد تزيد.

يجب إعلام الطبيب و/أو طاقم المختبر، قبل الفحوصات المخبرية لرصد مستويات هورمونات الغدة الدرقية، بأنك تتناول أو تناولت البيوتين مؤخرًا (المعروف أيضًا كفيتامين H، فيتامين B7 أو فيتامين B8). قد يؤثر البيوتين في نتائج الفحوصات المخبرية. وفقًا للفحص، قد تكون النتائج مرتفعة أو منخفضة بشكل غير صحيح بسبب البيوتين. قد يطلب منك الطبيب التوقف عن تناول البيوتين قبل إجراء الفحوصات المخبرية. يجب أن تدرك أيضًا أن منتجات إضافية التي قد تتناولها، مثل الفيتامينات المتعددة أو المكملات الغذائية للشعر، الجلد والأظافر يمكن أن تحتوي أيضًا على البيوتين. هذا الأمر قد يؤثر في نتائج الفحوصات المخبرية. يجب إعلام الطبيب و/أو طاقم المختبر إذا كنت تتناول هذه المنتجات (انظر المعلومات في البند "التداخلات بين الأدوية").

التداخلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- يوتيروكس قد يؤثر على عمل الأدوية التالية:
 - أدوية مضادة للسكري (أدوية خافضة لمستوى السكر في الدم): يوتيروكس قد يقلل من تأثير دواء السكري الذي تتناوله، لذلك يمكن أن تحتاج إلى إجراء فحوص إضافية لمستويات السكر في الدم، خاصة عند بدء العلاج ب يوتيروكس. أثناء العلاج ب يوتيروكس، من الجائز أن يحتاج الأمر ملاءمة المقدار الدوائي للدواء المضاد للسكري الذي تتناوله.
 - مشتقات الكومارين (أدوية تستعمل لمنع تخثر الدم): يوتيروكس قد يزيد من تأثير هذه الأدوية. هذا الأمر يمكن أن يزيد الخطورة لحدوث نزف، خاصة لدى المسنين. لذلك من الجائز أن تكون هناك حاجة إلى فحوص منتظمة لقيم تخثر الدم عند بدء العلاج ب يوتيروكس وخلال. أثناء العلاج ب يوتيروكس، من الجائز أن يحتاج الأمر ملاءمة المقدار الدوائي للدواء من فصيلة الكومارين الذي تتناوله.

- احرص على تفيدك بالفواصل الزمنية الموصى بها للتناول إذا كنت تتناول الأدوية التالية:
 - الأدوية المستعملة لربط الحموض الصفراوية وتخفيض المستويات العالية للكوليسترول (مثل كوليستيرامين أو كوليستيپول): تأكد من أنك تتناول يوتيروكس أربع حتى خمس ساعات قبل تناول هذه الأدوية، لأنها قد تحجب امتصاص يوتيروكس من الأمعاء.
 - مضادات الحموضة (أدوية تستعمل للتخفيف من المشاكل الهضمية)، سوكرفات (لعلاج القرحة في المعدة أو الأمعاء)، أدوية أخرى الحاوية ألومنيوم، الأدوية الحاوية حديد، الأدوية الحاوية على كالسيوم: تأكد من أنك تتناول يوتيروكس ساعتين على الأقل قبل تناول هذه الأدوية، لأنها قد تقلل من تأثير يوتيروكس.

بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو من شأنك أن تتناول واحد من الأدوية المدونة أدناه، لأنها قد تضعف من تأثير يوتيروكس:

- پروبيول ثيوأوراسيل (دواء لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية)
- جلوكوكورتيكوستيديات (أدوية ستيروئيدية مضادة للتحسس ومضادة للالتهاب)
- حاجبات بيتا (أدوية خافضة لضغط الدم تستعمل أيضًا لعلاج أمراض القلب)
- سيرترالين (دواء لعلاج الاكتئاب)
- كلوروكوين أو پروجوانيل (أدوية لمنع الملاريا أو لعلاجها)
- أدوية تنشيط عمل إنزيمات معينة في الكبد مثل باربيطورات (أدوية مهدئة أو أقراص منومة)، كاربامازيبين (دواء لعلاج الصرع، يستعمل أيضًا لتعديل أنواع مختلفة من الألم ولموازنة اضطرابات في المزاج) أو مستحضرات تحتوي نبتة سانت جونز (دواء عشبي)
- أدوية حاوية إستروجين المستعملة للعلاج الهرموني البديل أثناء فترة سن اليأس وبعدها أو كوسائل مانعة للحمل
- سيفيلامير (دواء يربط الفوسفات يستعمل لعلاج مرضى يعانون من فشل كلوي مزمن)
- مثبطات تيروزين كيناز (أدوية مضادة للسرطان ومضادة للالتهاب)

- مثبطات مضخة البروتون (مثل أوميزازول، إيزوميرازول، بانتوبرازول، راببيازول، ولانسوبرازول) التي تستعمل لتقليل كمية الحمض المنتجة عن طريق المعدة، مما قد يقلل من امتصاص ليفوثيروكسين من الأمعاء وبالتالي يجعله أقل فعالية. إذا كنت تتناول ليفوثيروكسين أثناء علاجك بمثبطات مضخة البروتون، فسيقوم طبيبك بمتابعة وظيفة الغدة الدرقية لديك وقد يحتاج إلى ملاءمة جرعة يوتيروكس أورليستات (دواء يستعمل لعلاج السمنة المفرطة)

بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو من شأنك أن تتناول واحد من الأدوية المدونة أدناه، لأنها قد تزيد من تأثير يوتيروكس:

- ساليبيلات (أدوية تستعمل لتخفيف الألم أو لتخفيض السخونة)
- ديكومارول (دواء مضاد لتخثر الدم)
- فوروسيميد بجرعة دوائية عالية قدرها 250 ملغ أو أكثر (دواء مدر للبول)
- كلوفبيرات (دواء لتخفيض نسب الشحوم في الدم)

بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو من شأنك أن تتناول واحد من الأدوية المدونة أدناه، فهي قد تؤثر على عمل يوتيروكس:

- ريتونافير، إيندينافير، لوبينافير (مثبطات بروتياز، أدوية لعلاج HIV)
- فينيتوين (دواء لعلاج الصرع)

من الجائز أن تحتاج إلى إجراء فحوص منتظمة لقيم هرمون الغدة الدرقية. من الجائز أن يحتاج الأمر إلى ملاءمة الجرعة الدوائية لـ يوتيروكس.

بلغ الطبيب إذا كنت تتناول أميودارون (دواء يستعمل لعلاج اضطرابات نظم القلب)، لأن هذا الدواء قد يؤثر على وظيفة وعلى نشاط الغدة الدرقية.

إذا كنت بحاجة لإجراء صورة بأشعة رنتجن أو فحوص تشخيصية أخرى بواسطة مواد ظليلة تحوي يود، بلغ الطبيب بأنك تتناول يوتيروكس. من الجائز أن يتطلب منك تلقي حقنة التي قد تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية.

إذا كنت تتناول البيوتين أو تناولته مؤخرًا، فيجب عليك اعلام الطبيب و/أو طاقم المختبر قبل الفحوصات المخبرية لرصد مستويات هرمونات الغدة الدرقية. قد يؤثر البيوتين في نتائج الفحوصات المخبرية (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").

استعمال الدواء والطعام

بلغ الطبيب إذا كنت تتناول منتجات الصويا، خاصة إذا كنت تغير من نسبة منتجات الصويا التي تستهلكها في الغذاء. المنتجات الحاوية صويا قد تخفض امتصاص يوتيروكس من الأمعاء ولذلك من الجائز أن يحتاج الأمر تغيير الجرعة الدوائية التي تتناولها من يوتيروكس.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل، استمري بتناول يوتيروكس. تكلمي مع الطبيب، لأنه من الجائز أن تكون حاجة لملاءمة الجرعة الدوائية. إذا كنت تتناولين يوتيروكس بصورة متزامنة مع دواء مضاد لنشاط الغدة الدرقية من أجل معالجة فرط إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، سوف يوصيك الطبيب بالتوقف عن العلاج بـ يوتيروكس أثناء فترة الحمل.

إذا كنت في فترة الإرضاع، استمري بتناول يوتيروكس حسب ما أوصى به الطبيب. إن كمية الدواء المطروحة في حليب الأم تكون صغيرة بحيث لا تؤثر على الرضيع.

السياقة واستعمال الماكينات

لم تُجر أبحاث عن تأثير الدواء على القدرة على السياقة وتشغيل ماكينات. بما أن ليفوثيروكسين يشابه هرمون الغدة الدرقية المنتج في الجسم بصورة طبيعية، فمن غير المتوقع أن يضر الدواء يوتيروكس من القدرة على السياقة وتشغيل ماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على أقل من 1 مليمول (23 ملغ) من الصوديوم للجرعة - يعتبر "خال من الصوديوم".
 يحتوي يوتيروكس 25 مكغ على حتى 18 مكغ صوديوم
 يحتوي يوتيروكس 50 مكغ على حتى 19 مكغ صوديوم
 يحتوي يوتيروكس 100 مكغ على حتى 21 مكغ صوديوم

3. كيفية استعمال الدواء

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.
 الجرعة الدوائية وطريقة العلاج سوف يحددان من قبل الطبيب فقط.

يحدد لك الطبيب الجرعة الدوائية التي تناسبك بالإعتماد على فحوص مختلفة وفحوص مخبرية. تبدأ عادة بجرعة دوائية منخفضة، تزداد كل أسبوعين حتى أربعة أسابيع، إلى أن يتم ملاءمة الجرعة الدوائية النهائية لك شخصيًا. خلال الأسابيع الأولى للعلاج، يجب أن تُحدد لك مواعيد لإجراء فحوص مخبرية. يُعتمد على نتائج الفحوص لتحديد الجرعة الدوائية المناسبة لك.

إذا ولد رضيعك مع قصور في نشاط الغدة الدرقية (hypothyroidism)، من الجائز أن يوصي الطبيب بالبداية بجرعة دوائية أكبر، لأنه من المهم إعطاء البديل للهورمون بسرعة. الجرعة الدوائية الإبتدائية الموصى بها هي 10 حتى 15 ميكروغرام لكل كيلوغرام وزن جسم وذلك في الأشهر الثلاثة الأولى. بعد ذلك، يحدد الطبيب الجرعة الدوائية التي تناسب رضيعك.

المجالات الإعتيادية للجرعات الدوائية مسجلة في الجدول أدناه. مع ذلك، من الجائز أن جرعة دوائية أقل يمكن أن تكون مناسبة إذا:

- كنت مسنًا

- كنت تعاني من مشاكل في القلب
- كنت تعاني من قصور شديد أو متواصل في نشاط الغدة الدرقية
- كان وزن جسمك منخفضاً أو كان لديك ورم درقي كبير

الجرعة الدوائية اليومية الموصى بها من يوتيروكس		إستطببات لتناول يوتيروكس
75 حتى 200 ميكروغرام		• لعلاج تضخم الغدة الدرقية الحميد (ورم درقي حميد) لدى معالجين ذوي نشاط سليم للغدة الدرقية
75 حتى 200 ميكروغرام		• لمنع تكرار ظهور ورم درقي بعد عملية جراحية
للأطفال	لللكبار	• لإستبدال الهرمون الطبيعي المنتج من قبل الغدة الدرقية، إذا كانت الغدة الدرقية لا تنتج ثيروكسين بكمية كافية
12.5 حتى 50 ميكروغرام	25 حتى 50 ميكروغرام	- جرعة دوائية إبتدائية
100 حتى 150 ميكروغرام لمتر مربع من سطح الجسم	100 حتى 200 ميكروغرام	- جرعة دوائية داعمة
150 حتى 300 ميكروغرام		• لتثبيط نمو الورم لدى معالجين يعانون من سرطان الغدة الدرقية
50 حتى 100 ميكروغرام		• لموازنة مستويات الهرمون الذي تنتجه الغدة الدرقية، عندما يعالج فرط نشاط الغدة الدرقية بأدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقية
150 ميكروغرام: بدء العلاج 4 أسابيع قبل الفحص: يجب البدء بـ 75 ميكروغرام لمدة أسبوعين، ومن ثم 150 ميكروغرام حتى الفحص		• لفحص سلامة نشاط الغدة الدرقية
200 ميكروغرام (قرصان من يوتيروكس 100 ميكروغرام): بدء العلاج: أسبوعان قبل الفحص		

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

- أقراص يوتيروكس مخصصة للإعطاء عن طريق الفم.
- دائماً يجب تناول كامل الجرعة اليومية صباحاً، على معدة خاوية (على الأقل نصف ساعة قبل وجبة الفطور)، من المستحسن مع قليل من سائل، مثلاً نصف كأس من الماء.
- للرضع يجب إعطاء كامل الجرعة اليومية من يوتيروكس على الأقل نصف ساعة قبل وجبة الطعام الأولى اليومية. قبل الاستعمال مباشرة، اسحق القرص واخلفه مع القليل من الماء، قبل إعطائه للطفل مع إضافة قليلة من سائل. حضر دائماً خليطاً طازجاً كالمطلوب.

للقرص خط شطر للتقسيم.

مدة العلاج:

تتعلق مدة العلاج بالحالة الصحية التي من أجلها أنت تتعالج بـ يوتيروكس. لذلك يناقشك الطبيب بخصوص الفترة الزمنية التي تحتاجها لتناول هذا الدواء. أغلب المعالجين يجب أن يتناولوا يوتيروكس طوال حياتهم.

إذا تناولت جرعة دوائية أكبر فمن الجائز أن تشعر بأعراض كنبض سريع، قلق، عدم هدوء أو حركات غير إرادية. اختلاجات قد تظهر في حالات فردية لدى معالجين يعانون من اضطرابات عصبية كالصرع. قد تظهر أعراض لاضطرابات نفسية (ذهان) حادة وذلك لدى مرضى معرضون لخطورة حدوث اضطرابات ذهانية. راجع الطبيب إذا كنت تلاحظ أي عرض من بين الأعراض المذكورة هنا. إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

يمنع تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص كيفية استعمال الدواء، راجع الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال في كل دواء، إن استعمال يوتيروكس قد يسبب أعراض جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز ألا تعاني من أيًا منها.

من الجائز أن تشعر بعرض واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية المذكورة أدناه إذا كنت تتناول يوتيروكس أكثر مما وصف لك، أو إذا كانت الجرعة الدوائية التي حددت لك غير ملائمة (مثلًا إذا تمت زيادة الجرعة الدوائية بشكل سريع):
نبض سريع أو غير منتظم، ألم في الصدر، صداع، ضعف عضلي أو تقلص عضلي، تورد الوجه (شعور بسخونة واحمرار في الوجه)، سخونة، تقيؤات، عدم انتظام الدورة الشهرية، ورم دماغي كاذب (pseudotumor cerebri)، ضغط زائد داخل الجمجمة)، ارتجاف، عدم الراحة، اضطرابات في النوم، تعرق، انخفاض في الوزن، حالات إسهال.

إذا كنت تلاحظ أي عرض جانبي من الأعراض التي ذكرت هنا، راجع الطبيب. من شأن الطبيب أن يقرر إيقاف العلاج لعدة أيام أو يقلل الجرعة الدوائية اليومية حتى اختفاء الأعراض الجانبية.

ردود فعل تحسسية لأي من مكونات يوتيروكس (انظر البند 6 "معلومات إضافية"). ردود فعل تحسسية يمكن أن تشمل طفح، شرى وانتفاخ الوجه أو الحنجرة (وذمة وعائية). فإذا حدث ذلك، راجع الطبيب حالاً.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

تبلغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية. يجب حفظ الدواء في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء.
- لا يجوز رمي الأدوية في مياه الصرف الصحي (المجاري) أو القمامة المنزلية. اسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد استعمالك بعد. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً -

Maize starch, citric acid (anhydrous), gelatin, croscarmellose sodium, magnesium stearate, mannitol.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبء:

أقراص يوتيروكس 25، 50 و 100 ميكروغرام هي بيضاء اللون، دائرية الشكل، مسطحة من جانبيها، ذات حافة مائلة. وعلى السطح العلوي للقرص يوجد خط للشرط مع الكتابة EM 25، EM 50 أو EM 100، حسب الترتيب.
تحتوي كل عبوة من يوتيروكس 25 مكغ على 50 أو 100 قرص.
تحتوي كل عبوة من يوتيروكس 50 مكغ ويوتيروكس 100 مكغ على 30، 50 أو 100 قرص.
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العبء.

صاحب الإمتياز وعنوانه: ميرك سيرونو م.ض.، شارع هاكيشون 18، يافنه 81220

اسم المنتج وعنوانه: Merck Healthcare KGaA، دارمشتات، ألمانيا

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

رقم تسجيل يوتيروكس 25 مكغ 170-16-37022-99

رقم تسجيل يوتيروكس 50 مكغ 147-50-33604-00

رقم تسجيل يوتيروكس 100 مكغ 147-51-33605-00

تم تحرير هذه النشرة في أيلول 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.